

硫酸妥布霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_AB\\_E9\\_85\\_B8\\_E5\\_A6\\_A5\\_E5\\_c22\\_308578.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E5_A6_A5_E5_c22_308578.htm) 药品名称硫酸妥布霉素  
药物别名乃柏欣、托普霉素、妥布接霉素、妥布毒素  
Nebcin，Obracine，Tobradistin 英文名称Tobramycin 类别抗痛  
风药说明注射剂：20mg，40mg，80mg；粉针剂：1g，2g。用  
法用量肌肉注射、静脉滴注：成人或儿童，每日3mg  
~ 5mg/kg，2~3次/日。疗程不宜超过10日注重事项妊娠C类  
。妊娠、哺乳期妇女慎用。有抗生素耳聋家族史的患者禁用  
。脑神经损害、重症肌无力、震颤麻痹等患者慎用。儿童、  
老年、长期用药者、肾脏功能减退患者应进行药物浓度、听  
力或前庭功能监测。应实现给药个体化，本品有效治疗血药  
浓度为4mg~10mg/L，应避免长时间超过12mg/L。肾功能障  
碍者应及时调整剂量。患者应足够饮水以减少肾小管损害。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)