

硫酸卡那霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_AB\\_E9\\_85\\_B8\\_E5\\_8D\\_A1\\_E9\\_c22\\_308589.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E5_8D_A1_E9_c22_308589.htm) 药品名称硫酸卡那霉素 药物别名卡那霉素A Kantrex 英文名称Kanamycin Sulfate 类别抗痛风药说明粉针剂：0.5g，1g；滴眼剂：2%8ml(10mg/ml.10mg/分)时用正常剂量的20%~30%，每24~48小时1次。#093.由于缺少特异性拮抗剂，卡那霉素过量或引起毒性反应时，主要用对症疗法和支持疗法，同时补充大量水分。血液透析或腹膜透析有助于从血中清除卡那霉素。注重事项妊娠D类。妊娠、哺乳期妇女禁用。儿童、老年、长期用药者、肾脏功能减退患者应进行药物浓度、听力或前庭功能监测。本品耐药菌较普遍，药敏试验证实敏感后方可使用。不可静脉注射。对本品或其他氨基糖苷类药物有过敏史者禁用。1.对一种氨基糖苷类抗生素，如链霉素、庆大霉素、阿米卡星等过敏的患者，可能对本品也过敏。2.在用药过程中应注重进行下列检查：(1)尿常规检查和肾功能测定，以防止出现严重肾毒性反应。(2)听力检查或听电图尤其高频听力测定，对老年人更为重要。3.有条件时应监测血药浓度，尤其新生儿，老年和肾功能减退的患者。每12小时给药1次时，血药峰浓度宜保持在15~30mg/ml，谷浓度5~10mg/ml；每24小时用药1次时血药峰浓度宜保持56~64mg/ml，谷浓度#091.孕妇及哺乳期妇女用药#091.儿童用药#091.老年患者用药&#093.老年患者应用本品易引起各种毒性反应，因此有条件时应在疗程中监测血药浓度，此外老年患者的肾功能有一定程度的生理性减退，即使其肾功能测定值在正常范围内仍应采用较小治疗量。100Test 下载频道开通

, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)