

奥美拉唑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A5_A5_E7_BE_8E_E6_8B_89_E5_c22_308603.htm 药品名称奥美拉唑药物别名(渥米哌唑，奥克，洛赛克，沃必唑，LOSEC，MOPRIAL) 英文名称omeprazole 类别抗痛风药说明品为白色至类白色结晶性粉末，熔点156。胶囊20mg。注射用粉针剂，每支40mg。用法用量本品可口服或静脉给药。治疗十二指肠溃疡，每日1次，每次20mg，疗程24周。治疗卓一艾二氏综合征，初始剂量为每日1次，每次60mg。90%以上患者用20—120mg / d即可控制症状。如剂量大于80mg / d，则应分2次给药。治疗反流性食管炎剂量为2060mg / d。治疗消化性溃疡出血，静注，1次40mg，每12小时1次，连用3天。注重事项不良反应主要为恶心、胀气、腹泻、便秘、上腹痛等。皮疹、ALT和胆红素升高也有发生，一般是稍微和短暂的，大多不影响治疗。对本品过敏者、严重肾功能不全者及婴幼儿禁用；严重肝功能不全者慎用，必要时剂量减半。本品具有酶抑制作用，一些经肝脏细胞色素P450系统代谢的药物，如双香豆素，地西洋、苯妥英等，其t_{1/2}可因合用本品而延长。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com