

加贝酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_8A_A0_E8_B4_9D_E9_85_AF_c22_308606.htm 药品名称加贝酯 英文名称Gahexate 类别抗痛风药说明常用其甲磺酸盐，为白色或类白色的松块状物或粉末。冻干粉针：每支0.1g。用法用量本品仅供静脉滴注。每次100mg，治疗开始3天，每日用量300mg，症状减轻后改为100mg/d，疗程6-10天。选以5ml注射用水注入冻干粉针瓶内，待溶解后注入5%葡萄糖液或林格氏液500ml中，供静脉点滴用。点滴速度不宜过快，应控制在每小时1mg/kg以内，不宜超过2.5mg/kg。注重事项1.对多种药物过敏史的患者及妊娠妇女和儿童禁用。2.本品使用过程中，应注重观察，少数病例滴注本品后可能出现注射血管局部疼痛、皮肤发红等刺激症状及轻度浅表静脉炎，偶有皮疹、颜面潮红及过敏症状，极个别病例可能发生胸闷、呼吸困难和血压下降等过敏性休克现象，一旦发现应及时停药或抢救。3.勿将药液注入血管外，多次使用应更换注射部位。药液应新鲜配制、随配随用。#093.密封，在凉暗处保存。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com