

二甲基硅油 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E4_BA_8C_E7_94_B2_E5_9F_BA_E7_c22_308610.htm 药品名称二甲基硅油
药物别名oleum Dimethylis Silici、Simethicone、Mylocon
、Bicolon、Ovol。英文名称Dimethiconum 类别抗痛风药说明
为无色澄清的油状液体；无臭，无味，在乙醚、氯仿中能任
意混溶，在水和乙醇中不溶。具有显著的抗水性，挥发性低
，化学性质不活泼，高温时稳定。消胀片：每含二甲基硅
油20mg或50mg，氢氧化铝40mg或80mg。二甲基硅油气雾
剂Aerosolum Dimethiconi(消泡净气雾剂)：每瓶总量18g，内含
二甲基硅油0.15g，薄荷脑适量，溶于抛射剂氟里昂中。用
法用量口服：每次50-100mg，每日3次。气雾剂：将瓶倒置，
在距患者鼻或口10公分左右处，掀压瓶帽，在吸气时(或呼气
终末时)，连续喷入，可与给氧同时施行，直至泡沫减少、症
状改善为止。必要时可反复使用。注重事项口服：每
次50-100mg，每日3次。气雾剂：将瓶倒置，在距患者鼻或
口10公分左右处，掀压瓶帽，在吸气时(或呼气终末时)，连
续喷入，可与给氧同时施行，直至泡沫减少、症状改善为止
。必要时可反复使用。100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com