

二甲硅油 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E4_BA_8C_E7_94_B2_E7_A1_85_E6_c22_308612.htm 药品名称二甲硅油 英文名称DimethiconeSimethicone 类别抗痛风药说明色澄清的油状液体；无臭或几乎无臭，无味。在氯仿、乙醚、苯、甲苯或二甲苯中能任意混合，在水或乙醇中不溶。片剂：每片含二甲硅油25mg或50mg，另含氢氧化铝40mg或80mg为分散剂。二甲硅气雾剂：每瓶总量18g，内含二甲硅油0.15g，此外尚含适量薄荷脑及抛射剂氟里昂(F12)。二甲硅油散：含二甲硅油6%，为抗泡沫药，可使胃肠内泡沫破灭，提高胃肠检查和放射检查的清楚度用于胃镜检查时，在喷用麻醉剂前，口服或管注本品0.5%—10%的水悬液3050ml，半小时内完成镜检。胃肠气钡双重对比检查，服用产气粉后，服用含本品0.2%—0.4%的硫酸钡混悬液服后25分钟完成摄片。结肠气钡双重对比，灌肠，在硫酸钡混悬液中按0.2%—0.4%加入本品，进行双重造影法灌肠，当气钡充盈全结肠后摄片。注重：本品的水悬液应新鲜配制，3天内用完。用法用量1. 消胀气：1次0.10.2g，1日3次，嚼碎服。2. 抢救急性肺气肿：使用气雾剂，用时将瓶倒置，距患者口鼻约15cm处，掀压瓶帽，在吸气时(或呼气终末时)连续喷入或与给氧同时进行，直至泡沫减少、症状改善为止。必要时反复使用。#093. 其气雾剂瓶外防护套为防胀裂用，切勿撕下。温度过低不能喷雾时，应微加温后使用。注重事项气雾剂应密闭，在应凉暗处保存。温度高于42 时易胀裂。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com