

奥曲肽 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A5_A5_E6_9B_B2_E8_82_BD_c22_308621.htm

药品名称奥曲肽 英文名称ktreotide 类别抗痛风药用法用量1．治门脉高压引起的食管静脉曲张出血：0．1mg静注，以后0．5mg，每2小时1次静滴。2．应激性溃疡及消化道出血：0．1mg皮下注射，每日3次。3．重型胰腺炎：0．1mg皮下注射，每日4次，疗程37天。4．胃肠道瘘管和消化道内分泌系统肿瘤的辅助治疗：皮下注射0．1mg，每日3次；疗程1014天。5．突眼性甲状腺肿和肢端肥大症：皮下注射0．1mg，每日3次；肢端肥大症疗程1014天。注重事项1．对本品过敏者禁用，孕妇、哺乳期妇女和儿童禁用。肾、胰腺功能异常和胆石症患者慎用。2．少数患者长期治疗有形成胆石的报道，故在治疗前和治疗后应每612个月进行胆囊超声波检查1次。3．对胰岛素瘤患者，本品可能加重低血糖程度，并延长其时间，应注重观察。4．本品可减少环孢菌素的吸收，延缓对西咪替丁的吸收。5．主要不良反应有注射部位疼痛或针刺感，一般可于15分钟后缓解。消化道不良反应有厌食、恶心、呕吐、腹泻、腹部痉挛疼痛等，偶见高血糖、胆石、糖耐受异常和肝功有异常等。

#093.注射液：每支0．1mg(1ml) #093.2 —8 冰箱内贮存。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com