

盐酸去甲万古霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E5_8E_BB_E7_c22_308629.htm 药品名称盐酸去甲万古霉素 药物别名Demethylvancomycin 英文名称Norvancomycin Hydrochloride 类别抗痛风药 说明粉针剂：0.4g。(40万U)。本品为淡棕色粉末或冻干之块状物。用法用量缓慢静脉滴注：成人，0.8g~1.6g/日，1~3次/日；儿童，每日16mg~24mg/kg，1~3次/日。口服：成人，1.6g/日，4次/日，一日不宜超过4g；儿童，每日15mg~30mg(不宜超过1.6g)，4次/日。 注重事项妊娠及哺乳期妇女、严重肾功能不全患者慎用。突击性大剂量注射不当可致严重低血压，甚至心脏停搏。本品宜大量液体稀释，缓慢滴注。应定期进行听力测定。对万古霉素类抗生素过敏者禁用。 1. 本品不可肌肉注射，也不宜静脉推注。 2. 静脉滴注速度不宜过快，每次剂量(0.4~0.8g)应至少用200ml 5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液溶解后缓慢滴注，滴注时间宜在1小时以上。 3. 肾功能不全患者慎用本品，如有应用指征时需在治疗药物浓度监测下(TDM)下，根据肾功能减退程度减量应用。 4. 对诊断的干扰：血尿素氮可能增高。 5. 治疗期间应定期检查听力、尿液中蛋白、管型、细胞数及测定尿相对密度等。 #093.妊娠期患者避免应用本品。哺乳期妇女慎用。 #093.新生儿和婴幼儿中尚缺乏应用本品的资料。 #093.本品用于老年患者有引起耳毒性与肾毒性的危险(听力减退或丧失)。由于老年患者的肾功能随年龄增长而减退，因此老年患者即使肾功能测定在正常范围内，使用时应采用较小治疗剂量。 100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 www.100test.com