

磷霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A3\\_B7\\_E9\\_9C\\_89\\_E7\\_B4\\_A0\\_c22\\_308644.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_A3_B7_E9_9C_89_E7_B4_A0_c22_308644.htm) 药品名称磷霉素 英文名称 Fosfomycin 类别抗痛风药说明磷霉素钙胶囊：每胶囊0.1g。注射用磷霉素钠〔基〕：每瓶1g；4g。用法用量口服磷霉素钙，适用于尿路感染及轻症感染，成人2~4g/d，儿童1日量为50~100mg/kg，分3~4次服用。静注或静滴磷霉素钠，用于中度或重度系统感染，成人4~12g/d，重症可用到16g/d；儿童1日量按100~300mg/kg，均分为2~4次给予。1g药物至少应用10ml溶剂，如若一次用数g，则应按每1g药物用25ml溶剂的比率进行溶解，予以静滴或缓慢推注。适用的溶剂有：灭菌注射用水、5%~10%葡萄糖液、氯化钠液、含乳酸钠的输液等。注重事项（1）磷霉素钠的含钠量约为25%，以1g药物计，含钠约为11mmol，对于心、肾功能不全、高血压等患者应慎用。（2）毒性较轻，但仍可致皮疹、嗜酸细胞增多、血氨基转移酶升高等反应。口服可致胃肠道反应：肌注局部疼痛和硬结；静脉给药过快可致血栓性静脉炎、心悸等。（3）孕妇慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)