

去甲万古霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8E\\_BB\\_E7\\_94\\_B2\\_E4\\_B8\\_87\\_E5\\_c22\\_308646.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_8E_BB_E7_94_B2_E4_B8_87_E5_c22_308646.htm) 药品名称去甲万古霉素 英文名称Norvancomycin 类别抗痛风药说明注射用盐酸去甲万古霉素：每瓶0.4g（40万单位）〔相当万古霉素约0.5g（50万单位）〕用法用量口服（治疗伪膜性肠炎）：成人1次0.4g，每6小时1次，（每日量不可超过4g），儿童酌减。静滴：成人1日量0.8～1.6g，1次或分次给予。小儿1日量为16～24mg/kg，1次或分次给予。一般将1次量的药物先用10ml灭菌注射用水溶解，再加入适量等渗氯化钠注射液或葡萄糖输液中，缓慢滴注。如采取连续滴注给药，则可将1日量药物加到24小时内所用的输液中给予。注重事项（1）通常不作为第一线药物应用。作为一种二线药物，在常用抗菌药物无效或不能应用时（如伪膜性肠炎时）应用。（2）输入速度过快可产生红斑样或荨麻疹样反应，皮肤发红（称为红人综合征），尤以躯干上部为甚。输入药液过浓可致血栓性静脉炎，应适当控制药液浓度和滴速。（3）不可肌注，因可致剧烈疼痛。（4）可引起口麻、刺痛感、皮肤瘙痒、嗜酸细胞增多、药物热、感冒样反应以及血压剧降、过敏性休克反应等。（5）可致严重的耳中毒和肾中毒，大剂量和长时间应用时尤易发生。肾功能不全者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)