

替卡西林钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_9B_BF_E5_8D_A1_E8_A5_BF_E6_c22_308703.htm 药品名称替卡西林钠 药物别名羧噻吩青霉素钠 英文名称Ticarcillin Disodium 类别青霉素类说明【制剂规格】粉针剂：1g，3g.【药动学】肌肉注射Tmax为0.5～1h，体内分布广，脑膜炎患者脑脊液中浓度为血药浓度的30%～50%，胆汁中药物浓度较血药浓度高。主要由尿以原形排出。T1/2为1～2h。【不良反应】偶见变态反应。偶见血清转氨酶升高、肝炎症状，恶心、呕吐、神经系统反应、电解质代谢紊乱、紫癜、出血等反应。【相互作用】与氨基甙类抗生素等合用，对绿脓假单胞菌有协同作用。克拉维酸钾可增强本品的作用。其余参阅羧苄西林钠。用法用量敏感细菌感染，肌注或静脉滴注：成人3g～4g/日，3～4次/日。儿童每日0.2g～0.3g/kg，2～4次/日。严重全身性感染，静脉注射或滴注：成人12g～24g/日，4～8次/日。注重事项妊娠B类。过敏者禁用。不宜与血液、血浆等配伍。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com