

眼睑水肿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_9C_BC_E7_9D_91_E6_B0_B4_E8_c22_308712.htm

名称眼睑水肿所属科室眼科病因 变应性者通常引起单眼或双眼明显而多皱的眼睑水肿伴贫血和鳞屑。急性型，季节性变应性眼睑水肿是由于对空气传播的花粉过敏或直接由手将花粉传至眼睑而过敏所致（例如在花园劳动后）。慢性变应性反应为接触性过敏，由局部应用药物（例如阿托品，新霉素）或化妆品或金属（镍）引起，而常年变应性眼睑水肿是由于对土壤或动物或尘螨屑过敏所致其他变应性眼病）。旋毛虫病引起的慢性眼睑水肿常为双侧性，且很像变应性眼睑水肿，但在发病初期不一定有发热和其他全身症状。嗜酸粒细胞 > 10%为其特征。遗传性血管神经性水肿是因C1酯酶抑制物缺乏所致，亦可引起急性眼睑水肿。治疗 变应性眼睑水肿只需去除其致敏原因。眼睑冷敷可加速痊愈。假如水肿持续24小时以上，局部可加用皮质类固醇软膏（例如0.1%氟甲龙，每日3次，不超过7日）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com