

法莫替丁 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_B3_95_E8_8E_AB_E6_9B_BF_E4_c22_308730.htm 药品名称法莫替丁药物别名(GASTER, MK208, YmIII70) 英文名

称Famotidine 类别抗痛风药说明本品为白色或略呈黄白色结晶，无臭、味略苦。易溶于二甲基甲酰胺或冰醋酸，难溶于甲醇，极难溶于水、乙脂、无水乙醇或丙酮，在氯仿或乙醚中几乎不溶。熔点163—164。片剂：每片10mg，20mg，胶囊剂：每胶囊20mg；散剂：10%(100mg/8)；注射液：每支20mg(2ml)。用法用量口服，20mg，1日2次(早餐后，晚餐后或临睡前)，46周为一疗程，溃疡愈合后维持量减半，睡前服。肾功能不全者应调整剂量。缓慢静注或静滴20mg(溶于生理盐水或葡萄糖注射液20ml中)，1日2次(间隔12小时)。疗程5天，一旦病情许可，应迅速将静脉给药改为口服给药。注重事项1. 不良反应较少，最常见的有头痛、头晕、便秘和腹泻，发生率分别为4.7%、1.3%、1.2%和1.7%。偶见皮疹、荨麻疹(应停药)、白细胞减少、氨基转移酶升高等；罕见腹部胀满感、食欲不振及心率增加、血压上升、颜面潮红、月经不调等。2. 肾衰竭或肝病患者、有药物过敏史患者慎用；孕妇慎用，哺乳妇女使用时应停止授乳；对小儿的安全性尚未确立。3. 应在排除肿瘤和食管、胃底静脉曲张后再给药。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com