

海绵窦血栓形成 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_B5_B7_E7_BB_B5_E7_AA_A6_E8_c22_308752.htm 名称海绵窦血栓形成所属科室眼科病因本病除颅内感染直接播散外，主要为眼眶、面部、口腔、咽喉、耳、鼻、及副鼻窦等处的化脓性病灶蔓延而来。亦可由全身传染病的迁徙性感染所致，此外与体质虚弱、心功能不全及外伤等有关。临床表现 1．局部症状 (1)由于静脉回流障碍可发生眼球突出、球结膜及眼睑水肿、淤血、鼻根部水肿及耳后乳突水肿等。眼底可见视网膜静脉扩张、迂曲、视网膜水肿、出血，甚至有轻度视乳头水肿，继而发生视神经萎缩。(2)由于窦内神经受压迫可引起上睑下垂、瞳孔散大，直接、间接光反应消失，眼外肌麻痹（第Ⅲ对颅神经最先受累），眼球固定，角膜知觉消失以及三叉神经第一支分布区的疼痛等。上述静脉回流受阻及颅神经受累的症状，可因疾病的继续发展而于数日内迅速扩延至对侧。 2．全身症状：起病急骤，主要为头痛、恶心、呕吐。体温升高（呈弛张型波动）、脉搏变速、呼吸加快、白细胞增高，并可出现谵妄、嗜睡、烦躁不安以至昏迷等。诊断 1.眶蜂窝组织炎：常单侧发病，眼球固定多不完全，瞳孔间接对光反应消失者甚少，同时全身症状亦较轻。 2.眶内肿瘤：眶内肿瘤继发感染时，与海绵窦血栓形成相似，但此种感染症状常发生于眼球突出之后，可根据病史加以鉴别。治疗 1.参考眼眶蜂窝组织炎 2.应按危重病症给予抢救治疗。预防及预后 1.注重面部卫生，纠正挖鼻孔、拔鼻毛等不良习惯。 2.当鼻、唇、颊部发生疖肿时，应及时治疗，切忌挤压或滥行手术。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com