

酞氨西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E9\\_85\\_9E\\_E6\\_B0\\_A8\\_E8\\_A5\\_BF\\_E6\\_c22\\_308765.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E9_85_9E_E6_B0_A8_E8_A5_BF_E6_c22_308765.htm)

药品名称酞氨西林药物别名酞氨苄西林、氨苄青霉素酞酯盐酸盐 Talampicillin 英文名称 Talampicillin 类别青霉素类说明为氨苄西林酞酯，其制剂有萘磺酸盐，商品名为 Fisiopen，Talpen。口服制剂除萘磺酸盐外，尚有盐酸盐。酞氨西林萘磺酸盐 1.33g 相当于酞氨西林盐酸盐 1g，亦相当于氨苄西林 0.674g。剂量，国外以酞氨西林盐酸盐标示及计算，常用量为口服 0.25g ~ 0.5g/次，3次/日。酞氨西林盐酸盐 0.37g 相当于氨苄西林 0.25g。本品吸收后在体内迅速水解为氨苄西林而发挥抗菌功效。【不良反应】 偶有不适、喘鸣、眩晕、耳鸣等症状，应停止用药，以免发生休克； 偶有发热、皮疹、荨麻疹等过敏反应，应停止继续服药； 有恶心、食欲不振、白细胞减少、血小板减少等症。用法用量口服：一次 250mg，每日 3 ~ 4次；小儿每日按体重 15 ~ 40mg/kg 计算。注重事项 对青霉素过敏者禁用； 支气管哮喘、过敏体质及肾功能不全者，慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)