

眼眶骨膜炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9C\\_BC\\_E7\\_9C\\_B6\\_E9\\_AA\\_A8\\_E8\\_c22\\_308768.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_9C_BC_E7_9C_B6_E9_AA_A8_E8_c22_308768.htm) 名称眼眶骨膜炎所属科室眼科病因1.由全身传染病迁徙所致。2.副鼻窦的感染：如额窦炎或前筛窦炎可引起前部眼眶骨膜炎；后筛窦炎或蝶窦炎可导致后部眼眶骨膜炎。3.眼睑及泪囊部病变（结核、梅毒或真菌感染）的蔓延。4.外伤性感染。临床表现1.前部眼眶骨膜炎(1)急性眼眶骨膜炎：多为副鼻窦感染所致。最初可见感染处皮肤红肿或结膜充血、水肿，继则于眶缘部发生局限性坚硬的肿块，有自发性疼痛及触痛，疼痛可延及眉部，夜间尤甚。严重者尚可伴有发热、头痛、呕吐等症状。轻者数日后炎症即逐渐消退；病热严重者可致化脓，甚至引起骨髓炎，形成死骨，脓肿破溃后常造成瘻管。(2)慢性眼眶骨膜炎：多为结核、梅毒所致。结核性眼眶骨膜炎：多见于20岁以下的结核病患者，外伤常为诱因。其典型变化是所谓“骨壳”的形成。脓肿穿破或切开后，用探针可触至粗糙的骨外表面，坏死的骨片或碎屑可自创口排出。创口四周的皮肤组织向内翻卷，久不愈合；或虽愈合，但由于瘢痕组织与骨壁发生粘连，以致形成睑外翻及眼睑闭合不全。梅毒性眼眶骨膜炎：见于晚期梅毒，常发生在眶上缘处，眶骨膜逐渐变厚，很少形成脓肿，有时可致梅毒瘤。2.后部眼眶骨膜炎主要表现为眼球突出及眼球后部的压痛，而眼外部常无明显发炎现象。病变愈向后发展对于视神经的威胁愈大，非凡是眶尖部骨膜炎，预后较前部眼眶骨膜炎严重，常可形成“眶尖”综合症。假如骨膜下脓肿向眶内穿破，则可引起眶蜂窝组织炎，甚至向颅腔蔓延引脑膜炎而危及生命。治疗1.全身疗法：应针对

病因加以处理，由全身传染病或病灶感染所致者，应给予磺胺剂或抗生素，必要时应用激素，同时清除可能存在的原发病灶。结核性者须用抗痨药物；梅毒性者则行驱梅疗法。

2. 局部疗法：炎症期可热敷；已化脓者可切开引流；结核性者切开后需刮除腐骨及坏死组织，并注入链霉素。

3. 中医疗法：根据辨证施治原则进行处理。热毒盛者应清热解毒，方用五叶清毒饮合黄连解毒汤；证实虚寒者宜补虚散寒，方用阳和汤；阴虚内热者宜滋阴清热，方用清骨散；气血双亏者宜补气养血，方用八珍汤。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)