

氨苄西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_B0_A8_E8_8B_84_E8_A5_BF_E6_c22_308789.htm 药品名称氨苄西林 药物别名氨苄青霉素 英文名称Ampicillin 类别青霉素类 说明为半合成的广谱青霉素，其游离酸含3分子结晶水，供口服用；其钠盐供注射用。为白色结晶性粉末；味微苦。在水中微溶，在氯仿、乙醇、乙醚或脂肪油中不溶；在稀酸溶液或稀碱溶液中溶解。pKa为2.5和7.3。0.25%水溶液的pH为3.5~5.5。其钠盐为白色或类白色的粉末或结晶；无臭或微臭，味微苦；有引湿性。在水中易溶，在乙醇中略溶，在乙醚中不溶。10%水溶液的pH为8~10。本品在干燥状态下较稳定，受潮或在水溶液中，除降解反应外，还发生聚合反应，生成可致敏的聚合物。 胶囊剂：每胶囊0.25g。注射用氨苄西林钠：每瓶0.5g；1.0g。用法用量 1) 口服：1日量50~100mg/kg，分成4次空腹服用。 (2) 肌注：1次0.5~1g，1日4次。 (3) 静滴：1次1~2g，必要时可用到3g，溶于100ml输液中，滴注1/2~1小时，1日2~4次，必要时每4/小时1次。 儿童用量：1日100~150mg/kg，分次给予。 注重事项 (1) 本品可致过敏性休克 皮疹发生率较其他青霉素为高，可达10%或更多。有时也发生药热。 (2) 本品针剂应溶解后立即使用 溶解放置后致敏物质可增多。 (3) 本品在弱酸性葡萄糖液中分解较速 宜用中性液体作溶剂。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com