

呋布西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E5\\_91\\_8B\\_E5\\_B8\\_83\\_E8\\_A5\\_BF\\_E6\\_c22\\_308796.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_91_8B_E5_B8_83_E8_A5_BF_E6_c22_308796.htm) 药品名称呋布西林药物别名呋脲苄青霉素，呋苄西林，Furbenicillin 英文名称Furbucillin〔 〕类别青霉素类说明为半合成的抗假单胞菌青霉素，制品有钠盐和钾盐两种。钠盐或钾盐均为白色或类白色结晶性粉末，微有特异臭，味苦，溶于水，生成微黄色透明溶液。钠盐有一定引湿性。用法用量静注或静滴：成人4~8g/d，分4次给予，每次1~2g，溶于等渗氯化钠注射液50~100ml中，缓缓静注或静滴，控制在0.5~1小时左右滴完。极重感染时可加大剂量到12g/日。小儿1日量为100~150mg/kg，用法同上。注重事项（1）局部刺激反应较强，且溶解度较小，故不宜用于肌注；静注液浓度大或滴注速度快也会引起局部疼痛，应改用稀液或放慢速度。（2）用药前应做青霉素皮试。（3）副作用有消化道反应（包括恶心、呕吐、纳差，偶见上腹部灼热感和胃痛）；口周、面部和四肢皮肤麻木感；严重时有肌颤等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)