

头孢曲松钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E6\\_9B\\_B2\\_E6\\_c22\\_308825.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E6_9B_B2_E6_c22_308825.htm) 药品名称头孢曲松钠  
药物别名头孢三嗪，ROCEPHIN 英文名称Ceftriaxone Sodium〔 〕类别一代头孢说明为半合成的第三代头孢菌素。为白色至黄色的结晶性粉末，溶于水，略溶于甲醇，极微溶于乙醇，水溶液因浓度不同而显黄色至琥珀色。其1%溶液的pH约为6.7。注射用头孢曲松钠：每瓶1g。用法用量一般感染，每日1g，1次肌注或静注。严重感染，每日2g，分2次给予。脑膜炎可按1日100mg / kg（但总量不超过4g），分2次给予。淋病单次用药250mg即足。儿童用量一般按成人量的1 / 2给予。肌注：将1次药量溶于适量0.5%盐酸利多卡因注射液，作深部肌注。静注：按1g药物用10ml灭菌注射用水溶解，缓缓注入，历时2~4分钟。静滴：1次量1g或1日量2g，溶于等渗氯化钠注射液或5%~10%葡萄糖液50~100ml中，于0.5~1小时内滴入。注重事项（1）青少年、儿童使用本品，偶可致胆结石，但停药后可消失。（2）参见头孢噻肟钠和头孢唑林钠。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)