

过期产儿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E8_BF_87_E6_9C_9F_E4_BA_A7_E5_c22_308831.htm 名称过期产儿所属科室儿科病因至今尚未十分明确，常与下列因素有关：孕末期孕酮过多和雌激素过少；经常卧床休息，活动过少；胎位异常和胎儿畸形；营养条件好，维生素E过多；遗传因素和个人体质；子宫收缩乏力。病理过期产儿由于胎盘逐渐通过衰老，钙化，梗塞区增多，胎盘重量减轻，绒毛间隙狭窄，绒毛血管壁增厚闭合，胎盘功能下降以及胎儿增大压迫子宫，致使子宫血流减慢，子宫血供给减少导致进行性缺氧。临床表现胎盘功能良好的过期产儿，临床外观良好。二眼灵活，皮肤较白，似生后几天的新生儿，皮下脂肪丰满，指甲较长，头发较粗，毳毛消失，耳廓软骨富有弹性，乳头突出明显。胎盘功能不足的过期产儿主要表现在胎脂消失，进行性缺氧和胎儿子宫内营养不良。按程度不同分三期；胎脂消失，表皮角化层可因失去胎脂保护而浸软，生后变干就发皱，裂开，脱屑。在第一期的基础上缺氧进行性加剧，肠蠕去加快，***括约肌放松，而有胎粪排出，因而脐带、羊膜、皮肤染有胎粪，呼吸道吸入胎粪羊水。除以上症状外，由于胎粪排于羊水中已久，胎儿指甲，胎脂，皮肤及脐带均可染成黄绿色。治疗为了及早防止过期产胎盘功能不足导致的危险，必须及时考虑终止妊娠。应再次核对孕周及预产期，确系过期者作引产处理。娩出前做好新生儿窒息的抢救预备，使娩出的新生儿能及时进行气管插管，清除气管内异物及加压给氧等处理。随时注重呼吸道通畅。有羊水、胎粪吸入呆能者，应及早用氧，缺氧不能缓解者可使用人工呼吸

器，并纠正酸中毒，补充能量以防低血糖。给抗生素预防感染。预防及预后做好系统的产前检查，注重孕妇体重，如连续测定雌三醇有下降趋势，则应考虑终止妊娠。胎盘功能正常的过期产儿预后良好，由于颅骨较硬，凶门较小，颅骨缝狭，儿头塑形能力差，较易造成难产。若胎盘功能不足，则患病率及死亡率较一般为高。尤其是第二期症状过斯产儿，因急性缺氧，吸入污染胎粪的羊水，常可有严重的呼吸系统症状或缺氧性颅内出血。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com