

头孢唑肟 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_94_91_E8_c22_308833.htm 药品名称头孢唑肟

药物别名头孢去甲噻肟，CEFTIZOX 英文名称Ceftizoxime〔

〕类别一代头孢说明为半合成的第三代头孢菌素。常用其钠盐，为白色或浅灰黄色结晶性粉末，几无臭，易溶于水，略溶于甲醇，几不溶于乙醇、丙酮、氯仿中。水溶液pH为6~8。注射用头孢唑肟钠：每瓶0.5g；1g。用法用量1日剂量为0.5~2g，重症可用到4g，分为2~4次给予。肌注溶媒为灭菌注射用水或0.5%利多卡因注射液，静注溶媒为灭菌注射用水、等渗氯化钠注射液或葡萄糖注射液。如需静滴则可溶于注射用水后再加入输液中，控制滴入时间1/2~2小时。注重事项（1）除产生过敏、腹泻、恶心、呕吐、药物热等头孢菌素所共有的不良反应外，还有一时性的眩晕和头痛反应发生。（2）本品皮试液的浓度为300 μg/ml。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com