

头孢替安 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E6\\_9B\\_BF\\_E5\\_c22\\_308838.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E6_9B_BF_E5_c22_308838.htm) 药品名称头孢替安

药物别名头孢噻乙胺唑，PANSPORIN 英文名称Cefotiam〔  
〕类别一代头孢说明为半合成的第二代头孢菌素，制品为二  
盐酸盐，并加有一定量的无水碳酸钠。常用其二盐酸盐，为  
白色或微黄色粉末；略有特异臭；加水即泡腾溶解生成近中  
性的透明溶液，略溶于乙醇，不溶于丙酮或氯仿中。注射用  
二盐酸头孢替安：每瓶0.5g；1g。用法用量成人1日常用量为1  
~ 2g，分2~ 4次给予。严重感染，如败血症也可用至1日4g。  
肌注：用0.25%利多卡因注射液溶解后作深部肌注。静注：用  
灭菌注射用水、等渗氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液溶解，  
每0.5g药物稀释成约20ml，缓缓推注。静滴：1次用量溶于适  
量的5%葡萄糖注射液、生理盐水或氨基酸输液中，于30分钟  
内滴入。注重事项（1）偶可致过敏，必要时可用300 μg / ml  
浓度的药液进行皮试。（2）肾功能不全者应减量并慎用。  
本品使用期间要进行尿液化验，如若损及肾功能，则应停药。  
（3）用药期间肝氨基转移酶可能有一时性升高，停药后  
可恢复。（4）可引起血象改变，严重时应立即停药。（5）  
本品可致肠道菌群改变，造成维生素B和K缺乏，偶也可致继  
发感染。一般胃肠道反应有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。  
（6）与氨基糖苷类抗生素联合应用，一般认为有协同作用，  
但可能加重肾损害，同置于一个点滴器中可影响药物效价。  
（7）与呋塞米等强利尿剂合用可造成肾损害。（8）静注大  
量，可致血管疼痛和血栓性静脉炎，肌注时注重勿损及神经。  
（9）使用本品期间，应用碱性酒石酸铜试液进行尿糖试

验时，可得假阳性反应，直接抗人球蛋白（Coombs）试验也可得假阳性反应。（多数的头孢菌素均有此反应）。（10）本品溶解后应立即应用，否则药液色泽会变深。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)