

头孢呋辛钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_91_8B_E8_c22_308846.htm 药品名称头孢呋辛钠
药物别名头孢呋肟，ZINACEF 英文名称Cefuroxime Sodium
〔 〕 类别一代头孢说明为半合成的第二代头孢菌素。为白色或微黄色结晶性粉末，易溶于水。其水溶液，视浓度和溶剂的不同，由浅黄色至琥珀色。其游离酸的pKa为2.5，新制备液的pH为6~8.5。注射用头孢呋辛钠：每瓶0.75g；1.5g。用法用量肌注或静注，成人：1次750~1500mg，1日3次；对严重感染，可按1次1500mg，1日4次。应用于脑膜炎，1日剂量在9g以下。儿童：平均1日量为60mg/kg，严重感染可用到100mg/kg，分3~4次给予。肾功能不全者按患者的肌酐清除率制订给药方案：肌酐清除率>20ml/分者，每日3次，每次0.75~1.5g；10~20ml/分者每次0.75g，1日2次；<10ml/分者每次0.75g，1日1次。肌注：1次用0.75g，加注射用水3ml，振摇使成混悬液，用粗针头作深部肌注。静脉给药：每0.75g本品，用注射用水约10ml，使溶解成澄明溶液，缓慢静注或加到墨菲氏管中随输液滴入。注重事项（1）对青霉素过敏或过敏体质者慎用。（2）不良反应有皮肤瘙痒、胃肠道反应、血色素降低、血胆红素升高、肾功能改变等。肌注可致局部疼痛。（3）不可与氨基糖苷类置同一容器中注射。（4）与高效利尿药（如速尿）联合应用，可致肾损害。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com