

头孢拉定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022_E5_A4_B4_E5_AD_A2_E6_8B_89_E5_c22_308855.htm 药品名称头孢拉定
药物别名头孢环己烯，先锋霉素，VELOSEF 英文名
称Cefradine 类别一代头孢说明为第一代头孢菌素。其游离酸
供口服。注射制剂有两种：一种是游离酸与无水碳酸钠的混
合物（1 : 0.315）；另一种是游离酸与精氨酸的混合物。本品
为白色或类白色的结晶性粉末；微臭。在水中略溶，在乙醇
、氯仿、乙醚中几乎不溶。pKa为2.5和7.3。1%水溶液pH
为3.5~6。在碱性物质存在时，游离酸轻易溶解。用法用量成
人1日口服1~2g，分3~4次服用。小儿每日25~50mg / kg，
分3~4次服用。肌注、静注或滴注，成人1日2~4g，分4次注
射；小儿1日量为50~100mg / kg，分4次注射。肾功能不全者
按患者肌酐清除率制订给药方案：肌酐清除率 > 20ml / 分者
，每6小时服500mg；15~20ml / 分者，每6小时服250mg；
< 15ml / 分者，每12小时服250mg。注意事项（1）对青霉素
过敏或有过敏体质者及肾功能不全者慎用。对头孢类抗生素
过敏者禁用。（2）注射剂刺激性较低，适宜于肌注应用。
（3）可致菌群失调、维生素缺乏、二重感染等副作用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com