

搏动性眼球突出症 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_90_8F_E5_8A_A8_E6_80_A7_E7_c22_308861.htm 名称搏动性眼球突出

症所属科室眼科临床表现1．患侧眼球突出,随脉搏而搏动并

伴有杂音。2．以指压迫眼球或同侧颈总动脉能使突眼消减。

3．眼睑及结膜肿胀充血，有复视。4．第V颅神经第一支

受累时，可引起麻痹性角膜炎。5．由于静脉曲张，在眶上

方及内侧可触及一团柔软的肿团。6．眼底检查常发现视乳

头水肿、视网膜静脉迂曲扩张及视网膜出血。视力下降的程

度不等。7．本病骤然发病，患侧头部及眼后部疼痛，病人

常主诉能听到连续不断的隆隆声，检查者如将听诊器放于眼

上及眶部也能听到同样声音。诊断在具有外伤史、搏动和杂

音的突眼病例，诊断较易。当有第、VI、颅神经麻痹引

起复视时，颈内动脉与海绵窦血管瘘的可能性很大。动脉造

影有助于诊断及确定病变部位。在眶顶穿破，脑组织脱入眶

内所引起的突眼易与本症相混淆，头部X线拍片或CT检查，

可为鉴别提供可靠依据。另外还应注重与眶内含有丰富血管

的肿瘤相鉴别。一般血管性肿瘤起病缓慢。治疗现多采用结

扎患侧的颈内动脉或颈总动脉手术疗法，以降低动脉内压力

。治疗时应请脑外科会诊，由脑外科医生进行手术。药物治

疗效果都不令人满足。100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com