

氟氯西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_9F\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_B0_9F_)

[E6\\_B0\\_AF\\_E8\\_A5\\_BF\\_E6\\_c22\\_308862.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_B0_9F_E6_B0_AF_E8_A5_BF_E6_c22_308862.htm) 药品名称氟氯西林

英文名称Flucloxacillin〔 〕类别青霉素类说明本品系半合成的

抗葡萄球菌青霉素。常用其钠盐，为白色或类白色结晶性

粉末，易溶于水（1：1），溶于乙醇（1：12）或两酮（1

：12）。片剂（游离酸）：每片125mg用法用量口服（用游离

酸）：常用量为每次250mg，每日3次；重症用量为每

次500mg，每日4次，于食前0.5～1小时空腹服用。肌注：常

用量每次250mg，每日3次；重症每次500mg，每日4次。静注

：每次500mg，每日4次，将药物溶于10～20ml注射用水或葡

萄糖输液中推注，每4～6小时1次。1日量不超过8g。儿童：2

岁以下按成人量的1/42～10岁按成人量的1/2，根据体重适

当调整。也可按照每日25～50mg/kg，分次给予。注重事项

（1）对青霉素过敏者禁用。（2）注射时勿与血液、血浆、

水解蛋白、氨基酸以及脂肪乳配伍。（3）本品可使氨基糖苷

类降效，不可配伍。（4）其他参见苯唑西林钠。100Test下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)