

替卡西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_9B_BF_E5_8D_A1_E8_A5_BF_E6_c22_308873.htm 药品名称替卡西林
药物别名羧噻吩青霉素 英文名称Ticarcillin〔 〕 类别青霉素
类说明为半合成的抗假单胞菌青霉素。常用其钠盐，为白色
或类白色结晶性粉末（冻干制品为饼状物），易溶于水。其
游离酸的pKa为2.5和3.4，水溶液无色或微黄色透明，pH为6.0
~ 8.0。本品水溶液较为稳定。注射用替卡西林钠；每瓶1g
；3g；6g（效价）。用法用量成人1日量200~300mg/kg，分
次给予或1次3g，根据病情每3、4或6小时1次。按每g药物
用4ml溶剂溶解后缓缓静注或加入适量溶剂中静滴1/2~1小
时。泌尿系感染可肌注给药，1次1g，每日4次，用0.25~0.5%
利多卡因注射液2~3ml溶解后深部肌注。儿童1日用量为200
~300mg/kg。婴儿1日量为225mg/kg，7日龄以下婴儿则为1
日150mg/kg，均分次给予。注重事项参见青霉素。100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com