

头孢泊肟酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E6_B3_8A_E8_c22_308977.htm 药品名称头孢泊肟酯 药物别名施博 Banan，Cepodem 英文名称 Cefpodoxime Proxetil 类别二代头孢 说明头孢泊肟酯的化学名为(±)-1-羟乙基()-(6R, 7R)-7-#093.-3-(甲氧甲基)-8-氧代-5-硫杂-1-氮杂双环#093.辛-2-烯-2-羧酸酯，72-(Z)-(0-甲基肟)异丙基碳酸酯。分子式为C₂₁H₂₇N₅O₉S₂，分子量为557.6。用法用量 剂量，成人100mg(效价)/次，2次/日，饭后服。成人 - 上呼吸道感染包括急性中耳炎、鼻窦炎、扁桃体炎和咽喉炎等：100 mg，一日二次，疗程5-10天； - 下呼吸道感染：慢性支气管炎急性发作：200 mg，一日二次，疗程10天； - 急性社区获得性肺炎：200 mg，一日二次，疗程14天； - 单纯性泌尿道感染：100 mg，一日二次，疗程7天； - 急性单纯性淋病：单剂200 mg； - 皮肤和皮肤软组织感染：400 mg，一日二次，疗程7-14天。儿童 - 急性中耳炎：10 mg/kg一日一次，或5 mg/kg一日二次（每日最大剂量不超过400 mg一日一次，或200mg一日二次），疗程10天。 - 扁桃体炎、鼻窦炎：10 mg/kg /天（最大剂量不超过200 mg/天，分2次服用），疗程5-10天。用药过量：未有药物过量报道。药物过量可能有以下症状：恶心，呕吐，腹泻，上腹不适。由药物过量引起的严重毒性反应，肾功能许可的情况下，可用血透和腹膜透析以降低体内头孢泊肟酯的血清浓度。用药须知 本品宜饭后服用。注重事项 对青霉素过敏者慎用。被诊断为伪膜结肠炎的腹泻患者，过敏体质的患者，以及应用利尿剂的病人慎用。与其它抗生素一样，长期使用头孢泊肟酯可能会引致非敏感微生物（例如念珠菌，

肠球菌，艰难梭状芽胞杆菌) 过度生长，因而可能需要中断治疗。曾有因使用抗生素而出现伪膜结肠炎的报告，因而在使用抗生素期间或之后发生严重腹泻的病人应考虑这种诊断的可能。已知头孢菌素类药物可引起Coombs 直接反应阳性。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com