

头孢甲肟 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E7_94_B2_E8_c22_309001.htm

药品名称头孢甲肟
药物别名倍司特克，BESTCALL 英文名称Cefmenoxime〔 〕
类别二代头孢说明为半合成的第三代头孢菌素，制品为半盐酸盐（ $C_{16}H_{17}N_9O_5S_3$ ） $2HCl$ ，并加有一定量的无水碳酸钠。其半盐酸盐为白色至淡黄色粉末，加水即泡腾溶解成澄明药液，由于浓度不同，是无色至淡黄色， $pH7.0 \sim 7.5$ 。用法用量成人一般感染：1~2g/d，分2次静注，严重感染可增至4g/d，分2~4次用。儿童：一般1日量为40~80mg/kg，重症可增为160mg/kg，脑膜炎可用到200mg/kg，分3~4次给予。注重事项（1）偶致过敏性休克及其他过敏症状。（2）其他不良反应有肾脏损害、血象改变、肝功能受损、菌群失调和出血倾向等。（3）肌注可致局部刺激症状，可用0.5%盐酸卡波卡因注射液（或其他局麻药）为溶剂以减轻刺激，但不要把此溶剂误作静脉应用。（4）为了防止过敏反应的发生，用前应了解患者的药物过敏史，必要时须用300 $\mu g/ml$ 浓度的药液作皮试，阴性后方可应用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com