

头孢美唑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E7_BE_8E_E5_c22_309016.htm

药品名称头孢美唑
药物别名先锋美他醇、CEFMETAZON 英文名称Cefmetazole

〔 〕类别二代头孢说明系头霉素类半合成抗生素，性能与第二代头孢菌素相近。常用其钠盐，为白色或微黄色粉末或团块；几无臭；极易溶于水，易溶于甲醇，略溶于丙酮，微溶于乙醇。露置空气中有引湿性。用法用量成人：1日量为1~2g，分为2次，静注或静滴。儿童：1日量为25~100mg/kg，分为2~1次，静注或滴注。重症或顽症时，成人可用到1日4g，儿童可用到1日150mg/kg。溶剂可选用等渗氯化钠注射液或5%葡萄糖液，静注时还可用灭菌注射用水（但不适用于滴注，因渗透压过低）。注重事项（1）偶可致过敏，出现荨麻疹、皮疹、药热等，也还可致休克，对于曾用头孢菌素类药物过敏者，以及过敏体质者应慎用，最好能在用前进行皮试（皮试液浓度300 μg/ml），在用药过程中发生过敏症状即应停药。（2）偶可致BUN升高，停药可恢复。由于主要经肾排泄，肾功能受损者应慎用。（3）偶可致嗜酸细胞增多、白细胞减少以及红细胞减少。（4）少数病人可有氨基转移酶和碱性磷酸酶升高。（5）消化道不良反应有恶心、呕吐和腹泻等。极少数病例可致伪膜性肠炎、应予警惕。也可致念珠菌二重感染。（6）本品应用可影响某些检验结果，如斑氏或斐林氏尿糖试验可显示假阳性、直接抗人球蛋白（Coombs）试验假阳性以及血肌酐（Jaffe法）升高。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com