

视网膜色素上皮炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E8_A7_86_E7_BD_91_E8_86_9C_E8_c22_309044.htm 名称视网膜色素上皮炎所属科室眼科临床表现1.自觉症状：发病急，视力急剧下降，视物朦胧灰暗，并有小视症，但病愈后视力可恢复正常。视野检查有相对性中心暗点。 2.眼底表现：后极部可见病灶群集，圆形约1/4PD大小，灰黑色小点状成葡萄串状，有时合并有视网膜神经上皮层的浆液性扁平脱离。其四周有色素脱落的黄白色环，病愈后可留有色素小点或无痕迹。至退行期，灰点变黑或变浅色而看不清，淡色环消失。 3.眼底荧光血管造影：黄斑部可见成族的葡萄状荧光斑点，以及中黑（遮盖荧光）外亮（透见荧光）的环形灶，有时有少量的荧光素渗漏。诊断1.多见于青壮年男性，发病急，多单眼忽然发病，亦可双眼先后发病，有自限倾向，多次复发者可致永久性视力障碍。 2.视力急速减退，眼前黑影，视物变形变色。 3.眼底典型征象为黄斑可见暗灰色斑点绕以淡色素环，多族集成葡萄状，荧光造影可见中黑外亮的荧光现象。治疗1.大量使用抗病毒药物。 2.口服广谱抗生素、维生素B族、维生素C。 3.大量血管扩张剂及能量合剂。 4.中药：清热解毒剂。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com