

丝状角膜病变 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E4_B8_9D_E7_8A_B6_E8_A7_92_E8_c22_309053.htm 名称丝状角膜病变所属科室眼科病因可能与下列因素有关： 上皮细胞的异常增殖； 基底膜与前弹性膜接合异常； 类粘液形成过多。多见于干眼病和病毒感染（腺病毒、HSV等），也可见于神经营养性角膜炎瘢痕性角膜炎（沙眼、天疱疮等）。此外角膜擦伤、戴角膜接触镜、内眼手术后包括也可引起该病变。

诊断1.有长期蒙眼病史，或患有角膜干燥症、绝对期青光眼等。 2.轻者仅有眼部异物感，重者角膜刺激症状明显。 3.角膜表面上皮呈卷丝状，可细如针尖，或粗如芝麻，一端附着于上皮，另端游离，多见于上方角膜缘四周。治疗除去致病原因，局部滴用角膜滑润剂、粘液溶解剂（乙酰半胱氨酸）及5%生理盐水即可。无效时间可在裂隙灯下，表面麻醉后用棉签蘸生理盐水除去丝状物。也可蘸乙醚、1%~2%硝酸银或10%硫酸锌等擦拭丝条，然后立即用生理盐水冲洗，加眼罩覆盖患眼一日。配戴软性角膜接触镜有一定疗效。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com