

氟氧头孢钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E6_B0_9F_E6_B0_A7_E5_A4_B4_E5_c22_309054.htm 药品名称氟氧头孢钠
英文名称Flomoxef Sodium [] 类别二代头孢说明本品为半合成的氧头孢烯类抗生素，抗菌性能与第四代头孢菌素相近。白色至浅黄白色粉末或冻干物。无臭，极易溶于水或甲醇，溶于乙醇或无水乙醇，几不溶于乙醚。用法用量轻症：成人1日量1~2g，分成2次静注；儿童1日60~80mg/kg，分2次静注或静滴。重症：成人1日4g，分2~4次用；儿童1日150mg/kg，分3~4次用。注重事项（1）对青霉素类过敏及过敏体质者慎用。严重肾功能障碍者、依靠静脉营养者、高龄者及全身状态恶化者均应慎用。（2）不良反应有肾功能减退（BUN上升），造血系统变化（红细胞减少、粒细胞减少、血红蛋白降低、嗜酸细胞增多、血细胞比容下降、血小板减少或增多，并罕见溶血性贫血），肝酶单项或多项上升，恶心、呕吐、腹泻、软便、伪膜性肠炎（罕见），皮疹及瘙痒，过敏性休克，药物热，咳嗽、呼吸困难及肺X光影象改变症状，口腔炎，头晕、倦怠、血或尿淀粉酶升高以及注射局部静脉炎等。（3）对孕妇及新生儿的用药安全性尚未确定，一般不宜应用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com