

拉氧头孢钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E6_8B_89_E6_B0_A7_E5_A4_B4_E5_c22_309057.htm 药品名称拉氧头孢钠
药物别名羧氧酰胺菌素，拉他头孢 moxalactam，shiomarin
英文名称latamoxef sodium〔 〕类别二代头孢说明本品是半合成的氧头孢烯（oxacephem）类抗生素，抗菌性能与第三代头孢菌素相近。常用其钠盐，为白色或淡黄白色粉末或块状物，无臭。易溶于水和甲醇，微溶于乙醇，几不溶于丙酮、乙醚、氯仿、醋酸乙酯或己烷等非极性溶剂中。本品水溶液的ph为5.0~7.0。用法用量（1）肌注：1次0.5~1g，每日2次，用0.5%利多卡因注射液溶解，深部肌注。（2）静注：1次1g，每日2次，溶解于10~20ml液体中，缓缓注入。（3）静滴：1次1g，每日2次，溶于液体100ml中滴入，重症可加倍量给予。（4）儿童用量：1日40~80mg/kg，分2~4次。静注和静滴可用等渗氯化钠溶液、5%~10%葡萄糖注射液、灭菌注射用水、低分子右旋糖酐注射液等作溶剂，但不得与甘露醇注射液相配伍。注重事项（1）偶可致过敏性休克或其他过敏症状。（2）其他不良反应有肾脏损害、血象改变、肝功能受损、胃肠道反应、菌群失调等。（3）本品还可致出血倾向，剂量增大时尤甚。（4）溶解后应立即使用，未用完的药液必须在冰箱中保存，在24小时内用完。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com