

小儿急性支气管炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B0\\_8F\\_E5\\_84\\_BF\\_E6\\_80\\_A5\\_E6\\_c22\\_309065.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E6_80_A5_E6_c22_309065.htm) 名称小儿急性支气管炎所属科室儿科病因病原是病毒、肺炎支原体或细菌，或为其合并感染。病毒感染中，以流感、腺病毒、3型副流感及呼吸道融合胞病毒等占多数，肺炎支原体亦不少见。凡可引起上呼吸道感染的病毒都可成为支气管炎的病原体，在病毒感染的基础上，致病性细菌可引起继发感染。较常见的细菌是肺炎球菌、  
“上呼吸道感染”实热喘”处理，重者参考毛细支气管炎及支气管哮喘的治疗处理。2.中医疗法  
本病中医称为外感咳嗽，由于致病因素不同，临床分为风寒咳嗽、风热咳嗽和实热喘。治法以疏风散寒、清热宣肺、降热平喘为主。可结合临床辨证施治。(1)风寒咳嗽：以忽然咳嗽，声咳急频为主，痰稀薄、鼻塞、流清涕、咽痒或伴头痛、恶寒或不发热、苔微白，脉浮。治以辛温解表，散寒止咳。常用杏苏散加减。处方举例：杏仁6g，苏叶3g，前胡9g，半复6g，牛蒡子6g，生姜3片。(2)风热咳嗽：咳嗽不爽，痰以黄粘稠为主，咽红口干，鼻塞流黄涕，或伴发热有汗，舌苔身微黄白，脉浮数。治以辛凉解表，宣肺止咳。常用桑菊饮加减。(3)实热喘：除上述症状外，患儿发热较高，同时伴有顺喘憋。治以宣肺化痰，降逆平喘。常用麻杏石甘汤加减。外方举例：麻黄3g，杏仁6g，生石膏15g，甘草3g，青黛3g，苏子6g，莱菔子9g，可随证选加其它药物1~2味：表邪重时加菊花9g，鲜芦根15g。热重时加黄芩6g，银花9g，连翘9g。咳嗽重时加前胡9g或百部9g。喘重时选加郁金6g，

银杏9g或生赭石15g。 痰多时加葶苈子9g， 菱仁9g。 3.其它治疗 有时需用适量的吐根糖浆， 婴幼儿每次2~15滴， 年长儿每次1~2ml， 每日4~6次， 可使痰液易于咳出。 10%氯化铵溶液也有同样作用， 其剂量为每次0.1~0.2ml/kg。 并发细菌感染时， 可选用适当抗菌药物。 此外对迁延性支气管炎可加用超短波或紫外线照射。 100Test 下载频道开通， 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)