

头孢噻肟钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_99_BB_E8_c22_309069.htm 药品名称头孢噻肟钠 药物别名头孢氨噻肟，CLAFORAN 英文名称Cefotaxime Sodium 类别二代头孢说明为半合成的第三代头孢菌素。为白色、类白色或淡黄白色结晶；无臭或微有非凡臭。在水中易溶，在乙醇中微溶，在氯仿中不溶。10%溶液的pH为4.5~6.5。稀溶液无色或微黄色，浓度高时显灰黄色。若显深黄色或棕色则表示药物已变质。用法用量临用前，加灭菌注射用水适量使溶解，溶解后立即使用。成人；肌肉或静脉注射，1次0.5~1g，1日2~4次。一般感染用2g/日，分成两次肌注或静注；中等或较重感染3~6g/日，分为3次肌注或静注；败血症等6~8g/日，分为3~4次静脉给药；极重感染1日不超过12g，分为6次静脉给药；淋病用1g肌注（单次给药已足）。静滴，2~3g/d。小儿：肌注或静注1日量为50~100mg/kg，分成2~3次给予。婴幼儿不能肌注。注重事项（1）对青霉素过敏和过敏体质者、严重肾功能不全者慎用。（2）长期用药可致二重感染，如念珠菌病、伪膜性肠炎等，应予警惕。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com