

头孢克洛 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E5\\_85\\_8B\\_E6\\_c22\\_309078.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_85_8B_E6_c22_309078.htm) 药品名称头孢克洛  
药物别名头孢氯氨苄，CECLOR 英文名称Cefaclor〔 〕类别  
二代头孢说明为半合成头孢菌素，抗菌性质属第一代。白色  
或类白色结晶性粉末，略溶于水（1：100），极微溶于氯仿  
、乙醚或甲醇中，2.5%水混悬液的pH为3～4.5，对胃酸稳定  
，遇碱逐渐分解。用法用量成人口服常用量为250mg，每8小  
时1次，重病或微生物敏感性较差时，剂量可加倍，但1日量  
不可超过4g。儿童：1日口服剂量为20mg / kg，分3次（每8小  
时1次）；重症可按1日40mg / kg给予，但1日量不超过1g。注  
重事项（1）对于肾功能轻度不全者，可不减用量；对肾功能  
严重不全或完全丧失者，应进行血药浓度监测，降低用量。  
（2）与食物同用时，血药峰浓度仅为空腹用药的50%～75%  
，故宜空腹给药。（3）长期应用可致菌群失调，还可引起  
继发性感染。（4）可透过胎盘，孕妇不宜应用。（5）与青  
霉素类有部分交叉过敏性，对青霉素过敏者应慎用。 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)