

头孢拉定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E6\\_8B\\_89\\_E5\\_c22\\_309080.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E6_8B_89_E5_c22_309080.htm) 药品名称头孢拉定

药物别名头孢环己烯，先锋霉素，VELOSEF 英文名

称Cefradine 类别二代头孢说明为第一代头孢菌素。其游离酸

供口服。注射制剂有两种：一种是游离酸与无水碳酸钠的混合物（1：0.315）；另一种是游离酸与精氨酸的混合物。本品

为白色或类白色的结晶性粉末；微臭。在水中略溶，在乙醇

、氯仿、乙醚中几乎不溶。pKa为2.5和7.3。1%水溶液pH

为3.5～6。在碱性物质存在时，游离酸轻易溶解。【制剂】胶

囊剂；每胶囊0.25g；0.5g。干混悬剂：0.125g；0.25g。注射用

头孢拉定（添加碳酸钠）：每瓶0.5g；1g。注射用头孢拉定A

（添加精氨酸）：每瓶0.5g；1g。用法用量成人1日口服1～2g

，分3～4次服用。小儿每日25～50mg/kg，分3～4次服用。

肌注、静注或滴注，成人1日2～4g，分4次注射；小儿1日量

为50～100mg/kg，分4次注射。肾功能不全者按患者肌酐清

除率制订给药方案：肌酐清除率>20ml/分者，每6小时

服500mg；15～20ml/分者，每6小时服250mg；<15ml/分者

，每12小时服250mg。注重事项（1）对青霉素过敏或有过敏

体质者及肾功能不全者慎用。对头孢类抗生素过敏者禁用。

（2）注射剂刺激性较低，适宜于肌注应用。（3）可致菌群

失调、维生素缺乏、二重感染等副作用。100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)