

老视（老花）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E8_80_81_E8_A7_86_EF_BC_88_E8_c22_309087.htm 名称老视（老花）所属科室眼科病因老视是一种自然的生理老化现象，每个人从四十岁起会产生这种现象。由于水晶体逐渐硬化，弹性逐渐减低，失去了它的柔软性，不能足够地鼓起，因此产生了调节不足，这样就在视近时感到困难。老花是每个人避免不了的生理调节减弱过程，并随着年龄的增加程度逐渐加深。临床表现老视眼初发生时常需将书报等目标移远或在强光下方能看清。以后，目标物虽放远亦不能看清，假如勉强阅读或做近距离工作就会出现眼困、眼痛、字迹模糊甚至头痛等视力疲惫症状。治疗配戴合适的老花镜（凸透镜）以补偿调节力的不足。正视眼一般初次（40岁）配戴1D的凸球镜即可（但应再根据个人实际工作需要适当地调整度数），以后每增加一岁多加0.1D，60岁以后增加减慢，最高不超过3.5D。对有屈光不正的病人，应在矫正屈光不正所用镜片度数的基础上，再按年龄与每个人实际需要给予应戴的老视镜片。所以，配镜之前一定要了解每个病人的近工作距离、两眼的屈光状态及调节力（调节广度）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com