

头孢特仑新戊酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E7_89_B9_E4_c22_309102.htm

药品名称头孢特仑新戊酯
药物别名富山龙、头孢特伦酯、头孢特仑酯、托米伦 Tomiron
英文名称cefteram pivoxil
类别二代头孢
说明本品为浅橙色薄膜包衣片，除去包衣后显白色至类白色。
用法用量
咽喉炎（咽炎、喉炎）、扁桃体炎（扁桃体四周炎、扁桃体四周脓肿）、急性支气管炎、肾盂肾炎、膀胱炎、子宫附件炎、子宫内膜炎、子宫内感染、巴氏腺炎、巴氏腺脓肿时：成人常规剂量为1日3次，一次50-100 mg，饭后口服。
慢性支气管炎、弥漫性细支气管炎、支气管扩张（感染时）、慢性呼吸系统疾病的重复感染、肺炎、中耳炎、副鼻窦炎、淋菌性尿道炎、牙周炎、冠周炎、上颌炎时：成人常规剂量为1日3次，一次100-200 mg，饭后口服。
对于重度肾功能不全患者，应慎重服药，适当调整剂量和间隔。
用药过量：没有特效解毒剂，一般为对症处理和支持疗法。
注重事项
对头孢特仑或本剂成分过敏的患者禁用。对青霉素类或头孢菌素类抗生素过敏的患者；本人或直系亲属中有支气管哮喘、皮肤荨麻疹等过敏体质的患者；严重肾功能不全的患者；口服吞咽困难或非经口摄取营养、全身状态恶化的患者慎用。
对实验室检查结果的影响：除尿糖试纸外的尿糖比色实验、本尼迪特（Benedict）实验等利用还原法进行的尿糖检查实验可出现假阳性反应。服药期间，直接库姆斯氏（Coombs）实验可显示阳性结果。
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com