

头孢唑啉钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_94_91_E5_c22_309138.htm 药品名称头孢唑啉钠
药物别名头孢菌素V，先锋霉素V、先锋5号、头孢唑林钠
Cefamezin 英文名称Cefazolin#093. 类别二代头孢说明粉针剂
：0.25g，0.5g。本品为白色或类白色的粉末或结晶性粉末；
无臭。用法用量肌注或静注：成人0.5g/次，2~4次/日；儿童
每日20mg~100mg/kg，2~4次/日。具体见下：成人常用剂量
：静脉缓慢推注、静脉滴注或肌肉注射，一次0.5~1g，一日2
~4次，严重感染可增加至一日6g，分2~4次静脉给予。儿童
常用剂量：一日50~100mg/kg，分2~3次静脉缓慢推注，静
脉滴注或肌肉注射。肾功能减退者的肌酐清除率大于50ml/分
时，仍可按正常剂量给药。肌酐清除率为20~50ml/分时，
每8小时0.5g；肌酐清除率为11~34ml/分时，每12小时0.25g；
肌酐清除率小于10ml/分时，每18~24小时0.25g。所有不同程
度肾功能减退者的首次剂量为0.5g。小儿肾功能减退者应用头
孢唑林时，先给予12.5mg/kg，继以维持量，肌酐清除率
在70ml/分以上时，仍可按正常剂量给予；肌酐清除率为40
~70ml/分时，每12小时按体重12.5~30mg/kg；肌酐清除率
为20~40ml/分时，每12小时按体重3.1~12.5mg/kg；肌酐清除
率为5~20ml/分时，每24小时按体重2.5~10mg/kg。本品用于
预防外科手术后感染时，一般为术前0.5~1小时肌注或静脉给
药1g，手术时间超过6小时者术中加用0.5~1g，术后每6~8小
时0.5~1g，至手术后24小时止。#093.本品无特效拮抗药，药
物过量时主要给予对症治疗和大量饮水及补液等。 注重事项
妊娠B类。专供肌注用的粉针剂内含利多卡因，不可静注。

对头孢菌素过敏者及有青霉素过敏性休克或即刻反应史者禁用本品。 1. 对青霉素过敏或过敏体质者慎用。 2. 约1%的用药患者可出现直接和间接Coombs试验阳性及尿糖假阳性反应（硫酸铜法）。 #093.本品乳汁中含量低，但哺乳期妇女用药时仍宜暂停哺乳。 #093.本品在老年人中T_{1/2}较年轻人明显延长，应按肾功能适当减量或延长给药间期。 #093.早产儿及1个月以下的新生儿不推荐应用本品。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com