

希刻劳 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B8\\_8C\\_E5\\_88\\_BB\\_E5\\_8A\\_B3\\_c22\\_309169.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_B8_8C_E5_88_BB_E5_8A_B3_c22_309169.htm) 药品名称希刻劳药物别名头孢克洛、希克劳 英文名称Cefaclor 类别二代头孢说明干糖浆剂：125MG、口服悬液混合后，贮藏在冰箱内；胶囊剂：250MG。用法用量成人常用量为250 mg，每8 hr口服1次。支气管炎，肺炎，鼻窦炎的疗程为10日。对于严重感染(如肺炎)或不太敏感的细菌引起的感染，剂量可加大1倍。最大日用量不得超过4 g。治疗男性和女性的急性淋球菌性尿道炎，给予3 g的单剂量，并联用丙磺舒1 g。儿童常用量为20 mg/kg体重/日，分次口服，每8 hr一次。对于支气管炎和肺炎，剂量为30 mg/kg体重/日，分3次口服。对于严重感染、中耳炎和不太敏感的细菌引起的感染，推荐服用40 mg/kg体重/日，分3次口服。最大剂量为1 g/日。肾功能不全者剂量通常不变。治疗β-溶血性链球菌感染时，疗程至少10日。注重事项已知对头孢菌素类抗生素过敏的病人。长期使用头孢克洛会使不敏感菌株大量繁殖，假如治疗期间发生重复感染，必须采取适当的措施。使用头孢菌素类抗生素治疗期间，库姆斯氏试验可呈直接阳性。严重肾功能不全者，有胃肠道疾病史，非凡是结肠炎的病人慎用。致癌、致畸性及对生育能力的影响没有进行研究以测定致癌性或致突变性的可能性。多次生殖研究显示，本药没有使生育力受损害的证据。对妊娠和哺乳的影响对小鼠和大鼠进行的多次生殖研究结果表明，没有危及胎儿的任何证据。然而对孕妇仍无适当的、很好的对照研究。所以除非急需，孕妇是不宜使用本品的。本药对分娩的影响尚未清楚。哺乳妇女1次口服500 mg后，在母乳中测出少量

的头孢克罗，但对乳婴的作用未知。给哺乳妇女服用头孢克  
罗要谨慎。对儿童的影响 1个月内婴儿使用本品的疗效和安  
全性尚未确立。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下  
载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)