

美爱克 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E7_BE_8E_E7_88_B1_E5_85_8B_c22_309178.htm 药品名称美爱克药物别名头孢妥仑 cefditoren pivoxil 英文名称Meiact 类别二代头孢说明本品除有效成分外还含有添加物聚磷酸钠2 mg和聚乙烯二醇。用法用量成人 200 mg bid，饭后服药，应随年龄及症状适宜增减。有高度肾损害的患者，注重延长给药间隔。应指导患者将药物从PTP板取出后服用。有报道，因误服PTP板致使硬锐角部刺入食道粘膜，进一步引起穿孔并发纵隔炎等重症合并症。注重事项对本药成分有休克既往史的患者禁用。对青霉素类、头孢菌素类抗生素有过敏既往史的患者，本人或双亲、兄弟有支气管哮喘、皮疹、荨麻疹等过敏体质患者，严重肾功能损害者，高龄者，经口摄食不足或非经口维持营养者、全身状态不良患者慎用。有时引起休克，故应仔细问诊。对临床检验结果的影响 除试纸反应外的贝内迪克特试剂、费林氏试剂及Clinitest进行的尿糖检查，有时呈假阳性，故应注重。直接库姆斯试验有时呈阳性，故应注重。此外，有本药降低血清中肉毒碱的报告。高龄者用药 高龄者与其他成人之间未见副作用差异，但通常高龄者生理机能减退，故应注重肾功能减退患者对本药的排泄延迟，易出现血中高浓度分布。另外，使用同类药物的高龄者有因维生素K缺乏引起出血倾向的报道。因此，应适当改变给药间隔。对妊娠和哺乳妇女的影响 尚未确立妊娠期用药的安全性，因此孕妇或可能妊娠的妇女仅在治疗的益处高于危险性时使用。对儿童的影响 尚未确立未成熟儿、新生儿、乳儿、幼儿或小儿用药的安全性（使用经验少）。100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 www.100test.com