

头孢氨苄 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E6_B0_A8_E8_c22_309473.htm 药品名称头孢氨苄
药物别名苯甘孢霉素，先锋霉素 英文名称Cefalexin 类别三代头孢性状白色或乳黄色结晶性粉末；微臭。在水中微溶，在乙醇、氯仿或乙醚中不溶。pKa为2.5、5.2和7.3。水溶液的pH为3.5~5.5。制剂片（胶囊）剂：每片（胶囊）0.125g；0.25g颗粒剂：1g：50mg。药理及应用对金黄色葡萄球菌（包括耐青霉素G菌株）、溶血性链球菌、肺炎球菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌、克雷白杆菌（肺炎杆菌）、流感嗜血杆菌、卡他球菌等有抗菌作用。葡萄球菌的部分菌株、粪链球菌、吲哚阳性变形杆菌、肠杆菌属对本品耐药。本品对绿脓杆菌无抗菌作用。本品口服吸收良好。空腹给药吸收率可达90%，口服0.25g、0.5g、1g，1小时的平均血清药浓度分别为9、18、32 $\mu\text{g}/\text{ml}$ ，6小时尚可测出。本品吸收后主要由尿原形排泄，8小时内可排出90%以上。口服0.25g后尿药峰浓度约1mg/ml。t_{1/2}约为0.6小时。临床上应用本品于上述敏感菌所致的呼吸道、泌尿道、皮肤和软组织、生殖器官（包括前列腺）等部位的感染，也常用于中耳炎。用法用量成人：1日1~2g，分3~4次服用，空腹服用。小儿：1日25~50mg/kg，分3~4次服用。注重事项1）对头孢菌素过敏者禁用。对青霉素过敏或过敏体质者慎用。（2）肾功能严重损害者应酌减用量。（3）服药后偶见胃肠道反应；恶心、腹泻、食欲不振等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com