

头孢呋辛片 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_91_8B_E8_c22_309484.htm 药品名称头孢呋辛片 药物别名头孢呋肟酯，新菌灵、西力欣、头孢呋辛酯 Zinnat，Zinacef 英文名称Cefuroxime 类别三代头孢制剂片剂：125mg，250mg，500mg。药理毒理本品为头孢呋新的醋酸乙酯，在体内水解后释出头孢呋新而发挥其抗菌活性。对革兰阳性菌阴性菌和厌氧菌有广谱抗菌活性。药动学口服头孢呋肟酯，2~3h后血药浓度达峰值。空腹时为7~10mg/L，饭后不足5mg/L。最低抑菌浓度可持续8h以上，半衰期1.2~1.6h。饭后服药可提高生物利用度（可达52%）。药时曲线下面积（AUC）可因饮用牛奶而增大。适应症用于敏感革兰阴性菌所致呼吸系统、泌尿系统、骨和关节、耳鼻喉、皮肤和软组织等的感染。不良反应偶见胃肠道不适、伪膜性肠炎，头痛或过敏。相互作用与呋塞米等强效利尿剂合用可引起肾损害。不可与氨基甙类抗生素混合于同一注射器内或输液瓶中。可干扰检测尿糖，出现假阳性反应。用法用量一般剂量成人250mg bid。下呼吸道感染成人500mg bid。单纯性尿道感染成人125mg bid。单纯性淋病成人单剂量1g。一般剂量儿童125mg bid。注重事项妊娠B类。对青霉素过敏者、妊娠及哺乳妇女慎用。（1）妊娠早期及哺乳期妇女慎用；（2）对青霉素过敏者慎用；（3）同时接受强利尿剂（如速尿）者，可使肾功能损害；（4）针剂不可与氨基糖甙类抗生素置于同一容器中注射；（5）片剂不可压碎后服用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com