

头孢三嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E4_B8_89_E5_c22_309486.htm

药品名称头孢三嗪
药物别名菌必治 头孢曲松钠 999罗塞秦 安塞隆 果复美 菌得治 罗氏芬
类别三代头孢
性状为白色至黄色的结晶性粉末，溶于水，略溶于甲醇，极微溶于乙醇，水溶液因浓度不同而显黄色至琥珀色。制剂注射剂：每瓶 1 g。不良反应头孢三嗪一般都能为人充分耐受。1.不良反应如皮疹及其它过敏反应、腹泻和其他胃肠紊乱，稍微的可逆性化验改变等。2.维生素 K 合成障碍及维生素 K 储备不足（如慢性肝病、营养不良）等病人，应监测凝血酶原时间，补充维生素 K。3.本品抗菌范围甚广，胆汁中排出甚多，故可使结肠菌群发生明显改变。4.本品与胆囊内胆汁泥沙形成有关，可致胆囊炎、胆结石，但停药后可消失。用法用量肌注或静注：一般感染，每日 1 次 1 g。严重感染则每日 2 g，分 2 次给予。脑膜炎可按 1 日每千克体重 1 0 0 m g（但总量不超过 4 g），分 2 次给予。淋病单次用药 2 5 0 m g 即足。儿童用量一般按成人量的 1 / 2 给予。肌注：将 1 次药量溶于适量 0 . 5 % 盐酸利多卡因注射液，作深部肌注。静注：按 1 g 药物用 1 0 m l 灭菌注射用水溶解，缓缓注入，历时 2 ~ 4 分钟。静滴：1 次量 1 g 或 1 日量 2 g，溶于等渗盐水或 5 % ~ 1 0 % 葡萄糖液 5 0 ~ 1 0 0 m l 中，于 0.5 ~ 1 小时内滴入。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com