

同立妥 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_90_8C_E7_AB_8B_E5_A6_A5_c22_309530.htm 药品名称同立妥 类别解热镇痛药 分子式成分药理毒理 本品的主要药效为中等程度的镇痛效应。一般药理实验结果显示，对小鼠的行为和自发活动无明显影响，对神经、心血管、呼吸系统基本上是安全的。药理学研究，小鼠和大鼠口服灌胃的LD50分别大于1.0和3.0/kg。按照美国和我国的有关毒物毒性标准，属低毒品，本药的肝肾毒性是可逆的。本复方制剂在镇痛效应方面显示出协同（增加或增强）作用。药动学本品经胃肠道吸收很快，有首过效应，达峰时间为12小时，很快分布于肝、肺和肾脏，本品消除主要在肝脏，代谢生成去甲基丙氧芬，经肾脏排泄，半衰期为6小时左右。适应症手术后痛，骨关节痛，牙痛、神经性痛、血管性头痛等，也可以缓解中、轻度肿瘤疼痛。不良反应少数病例出现消化道反应，如恶心、呕吐、上腹部不适。偶见头晕、嗜睡、便秘、纳差、口干、无力。用法用量口服成人每次12片，一日三或四次，饭后服。儿童酌减或遵医嘱。7岁以下儿童不宜服用。注重事项对呼吸抑制、头损伤、急性醇中毒、急性气喘发作者禁用。本品应遵照规定使用。对肝、肾和肾上腺皮质机能不全、妊娠、甲状腺机能减退者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com