

本芬醇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E6_9C_AC_E8_8A_B4_E9_86_87_c22_309550.htm 药品名称本芬醇 英文名称Benflumetol 类别主要用于控制疟疾症状的抗疟药性状黄色结晶性粉末，有苦杏仁臭，无味。在氯仿中易溶；在丙酮中略溶，在乙醇或水中几乎不溶。熔点为125~131℃。制剂胶丸：每粒0.1g药理及应用本品能杀灭疟原虫红内期无性体，杀虫比较彻底，治愈率为95%左右，但对红前期和配子体无效。小鼠、大鼠LD₅₀均大于10g/kg，属微毒类药；致突变和致畸试验均为阴性。本品口服吸收慢，消除亦慢，在体内停留时间较长。给药后t_{max}为4~5小时，t_{1/2}为24~72小时。主要用于恶性疟疾，尤其适用于抗氯喹恶性疟疾的治疗。用法用量4日疗法：成人，第1日顿服800mg，第2，3，4日各400mg，顿服；儿童每日顿服8mg/kg，连服4日，首剂加倍，儿童首剂最大用量不超过0.6g。注重事项（1）心脏病和肾脏病患者慎用。（2）恶性疟患者，在症状控制及红内期原虫消灭后可使用伯喹杀灭配子体。（3）临床观察217例未见明显不良反应，少数病人可出现心电图Q-T间期一过性轻度延长。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com