

磺胺甲唑〔典〕 sulfamethoxazole PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/309/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A3\\_BA\\_E8\\_83\\_BA\\_E7\\_94\\_B2\\_E5\\_c22\\_309570.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E7_A3_BA_E8_83_BA_E7_94_B2_E5_c22_309570.htm) 药品名称磺胺甲唑〔典〕 sulfamethoxazole 药物别名磺胺甲基异唑，新诺明，SMZ，SINOMIN 英文名称磺胺甲唑〔典〕 sulfamethoxazole 类别磺胺类性状白色结晶性粉末；无臭，味微苦。在水中几乎不溶，在稀盐酸、氢氧化钠试液或氨试液中易溶。pKa#061.5.6。制剂片剂：每片0.5g。复方磺胺甲唑〔基〕（复方新诺明，SMZ-TMP）片：每片含SMZ0.4g、TMP0.08g。用于支气管炎，肺部、尿路感染、伤寒等。成人及12岁以上儿童每日2次，每次服2片，首剂2~4片，早饭及晚饭后服。2~6岁儿童早晚各服儿童片（每片含SMZ0.1g、TMP0.029）1~2片，6~12岁早晚各服儿童片2~4片。近报道可引起药物过敏，轻者出现红斑性药疹，重者发生大疱性表皮松解、萎缩坏死性或剥脱性皮炎，甚至危及生命。故应用时须注重；对高度过敏体质非凡是对磺胺过敏者禁用。发现药物过敏（皮疹），应立即停药，并服抗过敏药物。此外尚可引起白细胞减少、肾功能损伤。用于肾功能不全患者，用量应为常用量的1/2，并且要进行监测。联磺甲氧苄啶片（增效联磺片）：每片含SMZ0.2g、SD0.2g、TMP0.08g，作用与复方磺胺甲唑片相似。口服，1次2片，1日2次。复方磺胺甲唑〔基〕（复方新诺明；SMZ-TMP）注射液：每支2ml，含SMZ0.4g、TMP0.089。用途同上。肌注：1日2次，每次2ml。静滴因副作用较多，故少用。药理及应用抗菌谱与SD相近，但抗菌作用较强。半衰期为11小时。在尿中乙酰化率高，且溶解度较低，故较易出

现结晶尿、血尿等。大剂量、长期应用时宜与碳酸氢钠同服。适用于尿路感染、呼吸道感染、皮肤化脓性感染、扁桃体炎等。与增效剂甲氧苄啶（TMP）联合应用时，其抗菌作用有明显增强，临床应用范围也扩大，可用于急性支气管炎、肺部感染、尿路感染、伤寒、布氏杆菌病、菌痢等，疗效与氨苄西林、氯霉素、四环素等相近。用法用量1日2次，每次服1g。注重事项参见磺胺嘧啶。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)