

头孢甲肟 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/309/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E7_94_B2_E8_c22_309588.htm 药品名称头孢甲肟
药物别名倍司特克，BESTCALL 英文名称Cefmenoxime 类别三代头孢性状其半盐酸盐为白色至淡黄色粉末，加水即泡腾溶解成澄明药液，由于浓度不同，是无色至淡黄色，pH7.0~7.5。制剂注射用半盐酸头孢甲肟：每瓶0.5g；1g。分子式成分为半合成的第三代头孢菌素，制品为半盐酸盐

($C_{16}H_{17}N_9O_5S_3$) $2HCl$ ，并加有一定量的无水碳酸钠。药理及应用抗菌谱与头孢噻肟相近似，对大肠杆菌、克雷白杆菌、奇异变形杆菌、流感嗜血杆菌等革兰阴性菌有甚强的抗菌作用；对吲哚阳性变形杆菌、肠杆菌属、沙雷杆菌、枸橼酸杆菌、伤寒及其他沙门杆菌、痢疾杆菌、化脓性链球菌、肺炎链球菌、淋球菌、消化球菌、消化链球菌等也有良好的抗菌作用。肌注0.5g或1g，血药浓度约30分钟达峰值，分别为10和30 $\mu g/ml$ 。静滴1g或2g，1小时滴注完毕，血药浓度分别为50和135 $\mu g/ml$ 。本品在胆汁、尿液中有很高浓度，在子宫、卵巢、盆腔渗出液中也有较高浓度，并可在化脓性脑膜炎患者的脑脊液中达到治疗浓度。本品 $t_{1/2}$ 约为1小时。主要用于各种敏感菌所致的呼吸系、肝胆系、泌尿生殖系、腹膜等部位的感染，并可用于败血症和烧伤、手术后感染。用法用量成人一般感染：1~2g/d，分2次静注，严重感染可增至4g/d，分2~4次用。儿童：一般1日量为40~80mg/kg，重症可增为160mg/kg，脑膜炎可用到200mg/kg，分3~4次给予。注重事项（1）偶致过敏性休克及其他过敏症状。（2）其他不良反应有肾脏损害、血象改变、肝功能受损、菌群

失调和出血倾向等。（3）肌注可致局部刺激症状，可用0.5%盐酸卡波卡因注射液（或其他局麻药）为溶剂以减轻刺激，但不要把此溶剂误作静脉应用。（4）为了防止过敏反应的发生，用前应了解患者的药物过敏史，必要时须用300 μg / ml浓度的药液作皮试，阴性后方可应用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com